

Algunas construcciones asociadas a categorías topológicas

Jorge Adelmo Hernández Pardo*
José Reinaldo Montañez Puentes*
Rodrigo Rincón Zarta***
Carlos Javier Ruiz Salguero****

Resumen

Dado un funtor topológico $F : C \rightarrow D$ se muestra la manera de asociar a algunas construcciones dadas en D , las respectivas construcciones en C , en particular las relacionadas con subcategorías reflexivas, correflexivas, uniones, intersecciones y topologías de Grothendieck.

Palabras claves

Funtor topológico, subcategoría reflexiva, subcategoría correflexiva, uniones, intersecciones, topos, topos de Grothendieck, topologías, haces.

Abstract

They summarize In view of a functor topológico $F: C \rightarrow D$ there appears the way of associating with some constructions given in D , the respective constructions in C , especially the related ones to reflexive (reflective) subcategories, coreflexive, unions, intersections and topologies of Grothendieck.

Key words

Reflexive subcategory, unions, intersections, moles, grothendieck's moles.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: jahernandezp@udistrital.edu.co.

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: jrmontanezp@unal.edu.co.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: rinconz@udistrital.edu.co.

Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Sergio Arboleda, Escuela Colombiana de Ingeniería. Correo electrónico: cruiz@escuelaing.edu.co.

1. Introducción

En una de sus direcciones de trabajo la topología categórica aparece como el estudio de la generalización del funtor olvido de estructura, definido como la categoría de los espacios topológicos en la categoría de los conjuntos, en especial de las propiedades relativas a la existencia de estructuras iniciales y finales que tiene dicho funtor.

1.1. Definición

Sea $F : C \rightarrow D$ un funtor. Se dice que F es un funtor topológico y que C es una categoría topológica relativa a F y a D si se cumplen las siguientes condiciones:

1. F es fiel.
2. F es apto para construir estructuras iniciales y finales.
3. Para cada conjunto X , la fibra $Fib(X)$ tiene estructura de retículo completo.

Esta definición es equivalente a la dada por Adamek, Herrlich y Strecker en *Abstract and Concrete Categories* [2], lo cual se demuestra en Nociones equivalentes de categorías topológicas [14], artículo en el que se relaciona esta noción con la dada por Preuss en *Theory of Topological Structures* [13].

Las categorías de los espacios topológicos, de los espacios uniformes y de los espacios de proximidad son algunos ejemplos de categorías topológicas. Estas categorías guardan relación con la categoría de los espacios topológicos, hechos que pueden encontrarse en *General Topology* [15].

Los objetos y morfismos de una categoría topológica los notaremos $X, Y, Z; f, g, h, \dots$, respectivamente, y su imagen por el funtor F la escribiremos $X, Y, Z; f, g, h$. Por ejemplo, en la categoría de los espacios to-

pológicos $f: X \rightarrow Y$ simboliza una función continua y $f: X \rightarrow Y$ denota su función correspondiente en la categoría de los conjuntos. La colección de funciones continuas de X en Y la notaremos $[X, Y]$.

Con el fin de introducir al lector en el tema y tomando como base las referencias indicadas, presentamos algunos de los conceptos básicos involucrados en la noción de categoría topológica y de uso frecuente en el desarrollo del trabajo.

Sea $F: C \rightarrow D$ un funtor. Se dice que F es fiel, si para todos: $g, f: X \rightarrow Y$ morfismos de C tales que $F(f) = F(g)$ se tiene que $f = g$.

Sea X un objeto de D . Notemos con $Fib(X)$ la colección de los objetos X de C , tales que $F(X) = X$. En $Fib(X)$ se define la relación " $<$ " así: dados X_1 y X_2 en $Fib(X)$, se dice que $X_1 < X_2$, si y solamente si, existe un morfismo $f: X_1 \rightarrow X_2$ tal que $F(f) = 1_X$. A la pareja $(Fib(X), <)$ se le llama la fibra de X y algunas veces se notará en la forma $Fib(F, X)$ o simplemente $Fib(X)$.

Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de C . Se dice que f cumple la propiedad universal a izquierda relativa al funtor F , el cual se omite en la escritura, cuando no hay lugar a confusión, si para todo objeto Z de C , con $F(Z) = Z$ y toda función $g: Z \rightarrow X$, para la cual exista un morfismo $h: Z \rightarrow Y$ tal que $F(h) = f \circ g$, existe un morfismo $g: Z \rightarrow X$ tal que $f \circ g = h$ y $F(g) = g$. En tal caso se dice que f es pui.

Ahora, se dice que un morfismo $f: X \rightarrow Y$ es apto para construir estructuras iniciales, si para todo objeto Y de C , tal que $F(Y) = Y$, existe un objeto X en C , con $F(X) = X$ y un morfismo $f: X \rightarrow Y$ que cumpla la propiedad universal a izquierda. En tal caso, se dice que X es la estructura inicial relativa a f y Y .

De manera dual, se tienen las definiciones de morfismo con propiedad universal a derecha y estructura final.

Toda función es apta para construir estructuras iniciales y finales en la categoría de los espacios topológicos Top, como se muestra a continuación:

Sea $f: X \rightarrow Y$ una función y a una topología sobre Y . Sea $r = \{f^{-1}(A) \mid A \in a\}$, entonces r es una topología sobre X . La función $f: X \rightarrow Y$ resulta continua con respecto a las topologías a y r y además f cumple la propiedad universal a izquierda.

Ahora, sea $g: W \rightarrow Z$ una función y X una topología sobre W . Sea $Q = \{B \mid g^{-1}(B) \in X\}$. Entonces, Q es una topología sobre Z . La función $g: W \rightarrow Z$ resulta continua con respecto a las topologías Q y X y además g cumple la propiedad universal a derecha.

Dados dos objetos X y Y de C , se dice que X es subobjeto Pui de Y , si X es un subobjeto de Y y X tiene la estructura inicial con respecto a Y como subobjeto de Y .

Si (Y, r) es un espacio topológico, un subobjeto de Y corresponde a un espacio topológico (X, a) , donde $X \subset Y$ y $a = \{X \cap C \mid C \in r\}$.

1.2. Afijación

Una categoría topológica fijada sobre una categoría completa (completa) es completa (completa).

2. Subcategorías reflexivas y coreflexivas

Las nociones de subcategorías reflexiva (coreflexiva) sugieren ideas de densidad y de mejoramiento de estructuras.

2.1. Categoría reflexiva

Sea C una categoría y H una subcategoría de C se dice que H es reflexiva en C si para todo $V \in C$ existe $V^* \in H$ y un morfismo $r_V: V \rightarrow V^*$ tal que para cualquier objeto $U \in H$ y cualquier morfismo $f: V \rightarrow U$ existe un único morfismo $r_f: V \rightarrow U$ tal que $r_f \circ r_V = r_f$ [1].

La siguiente proposición caracteriza las categorías reflexivas.

2.2. Proposición

H es una subcategoría reflexiva de C si el funtor de inclusión $I: H \rightarrow C$ admite adjunto a izquierda [1].

De manera dual se tiene la definición de subcategoría coreflexiva y su caracterización correspondiente.

2.3. Ejemplo

1. Sea X un espacio topológico. Se dice que X es un espacio completamente regular, si para todo A cerrado $A \subset X$ y todo $x \in X$ que no pertenezca a A , existe una función continua $f: X \rightarrow [0, 1]$ tal que $f(x) = 0$ y $f(A) = 1$ [15]. Los espacios completamente regulares junto con las funciones continuas determinan la categoría que notamos CR.

Se dice que un espacio topológico X satisface el axioma de separación T_1 si para todos $x \in X$, existen abiertos A y B con

Un espacio de Tychonoff, es un espacio completamente regular que satisface el axioma de separación T_1

Todo espacio compacto-Hausdorff es un espacio de Tychonoff. La categoría de los

espacios compactos-Hausdorff es una subcategoría reflexiva de la categoría de los espacios de Tychonoff. En este caso la reflexión de un espacio de Tychonoff corresponde a la compactificación de Stone-ech [15].

2. Sea (X, r) un espacio topológico y sea $P(X)$ el conjunto de las partes de X . Consideramos a r y $P(X)$ como las categorías inducidas por el ordenado por la inclusión. Entonces, r es correflexiva sobre $P(X)$. En este caso, la correflexión indica que el interior de un conjunto es el mayor abierto contenido en el conjunto. Notando con r' la colección de los cerrados, r' es reflexiva en $P(X)$, en tal caso esto indica que la adherencia de un conjunto es el menor cerrado que contiene al conjunto.

2.4. Proposición

Sea $F: C \rightarrow D$ un funtor topológico. Sea H una subcategoría reflexiva en D . Sea H^* la subcategoría plena de C , formada por los objetos Y de D tales que $F(Y)$ es un objeto de H . Entonces H^* es reflexiva en C .

Demostración

Sea X un objeto de C . Sea $F(X) = X$ y sea $r: X \rightarrow Y$ la reflexión de X en D . Puesto que F es funtor topológico existe Y en C tal que $Y \in H^*$, $F(Y) = Y$ y $r_x: X \rightarrow Y$ es morfismo en C , con $F(r_x) = r$. Veamos que Y es la reflexión de X . Sea Z un objeto de C y $f: X \rightarrow Z$ un morfismo de C , entonces $f: X \rightarrow Z$ es morfismo en D y puesto que H es reflexiva en D , existe $a: Y \rightarrow Z$ tal que $a \circ r_x = f$. Como F es funtor topológico existe $a: Y \rightarrow Z$ tal que $F(a) = a$. La fidelidad de F garantiza la unicidad de a .


Si en la proposición anterior, H es correflexiva en D , con una construcción dual se prueba que H^* es correflexiva en C .

3. Uniones e intersecciones


3.1. Definición

Sea A un objeto de una categoría C . Sea $\{(A_i, f_i)\}_{i \in I}$ una familia no vacía de subobjetos de A . La pareja (A', f) se denomina la intersección de la familia dada si $f: A' \rightarrow A$, es un morfismo tal que:

1. f se puede factorizar a través de cada f_i , es decir, existe $h_i: A' \rightarrow A_i$ tal que $f_i \circ h_i = f$ para cada $i \in I$.



2. Para cada pareja (A'', f') , para la cual existe $t_i: A'' \rightarrow A_i$ tal que $f_i \circ t_i = f'$, para cada $i \in I$, entonces, existe un único morfismo $p: A'' \rightarrow A'$, tal que $f \circ p = f'$ [9].




La intersección de una familia vacía de subobjetos de A , se define como la pareja $(A, 1_A)$. La intersección se acostumbra escribir: $\{A^1, f\}$, $(\bigcap A_i, f)$, $(f: A \rightarrow A)$ o simplemente $\bigcap A_i$.

También puede comprobarse que f es monomorfismo con lo cual (A', f) es un subobjeto de A y que para cada $i \in I$, h_i es único y es monomorfismo. Por otra parte, la intersección es única salvo isomorfismos.

Se dice que una categoría C tiene intersecciones, si cada conjunto de subobjetos de cualquier objeto de C tiene intersección. De manera natural, se define entonces, categoría con intersecciones finitas.

3.2. Definición

Sea C una categoría y $h: A \rightarrow B$, un morfismo de C . Sean (A', u) y (B', v) , subobjetos de A y B respectivamente. Se dice que A' es llevado en B' a través de h , si existe un morfismo $a: A' \rightarrow B'$ tal que $v \circ a = h \circ u$ [9].



Si A' puede ser llevado en B' a través de h , el morfismo a es único, puesto que v es monomorfismo.

3.3. Definición

Sea C una categoría y $\{(A_i, f_i)\}_{i \in I}$ una familia no vacía de subobjetos de un objeto A . Un subobjeto (A', f) de A se denomina la unión de la familia dada, si:

1. Cada f_i se puede factorizar a través de cada f , es decir, existen $h_i: A_i \rightarrow A'$, tales que $f \circ h_i = f_i$ para cada $i \in I$.
2. Si $h: A \rightarrow B$ es un morfismo y cada A_i puede ser llevado en un subobjeto (B', v) de B a través de f , entonces A' también puede ser llevado en (B', v) a través de h .

La unión se denota $(\bigcup A_i, f)$ o simplemente $\bigcup A_i$. Algunas veces se identifica con el morfismo $f: A' \rightarrow A$.

Nótese que la unión no es el concepto dual de la intersección. Puesto que f es monomorfismo, cada h_i es único en la condición de la factorización y además monomorfismo puesto que cada f_i lo es.

La unión de la familia $\{(A_i, f_i)\}_{i \in I}$ es única salvo isomorfismos.

Se dice que una categoría C , tiene uniones, si cada familia de subobjetos de un objeto dado tiene unión. De manera natural se define categoría con uniones finitas.

3.4. Proposición

Sea $F: C \rightarrow D$ un funtor topológico. Si D es una categoría con uniones, entonces C es una categoría con uniones de subobjetos pui.

Demostración

Sea $\{f_i: A_i \rightarrow A\}_{i \in I}$ una familia de subobjetos pui de $A \in C$. Entonces en D se determina una familia de subobjetos de A , $\{F(f_i): F(A_i) \rightarrow F(A)\}$. Sea $f: B \rightarrow A$ la unión de esta familia.

1. Puesto que F es un funtor topológico, existen B con $F(B)=B$ y $f: B \rightarrow A$ pui, con $F(f)=f$. Veamos que $f: B \rightarrow A$ es la unión de la familia $\{f_i\}_{i \in I}$ de subobjetos de A . Puesto que $f: B \rightarrow A$ es la unión de la familia $\{f_i\}_{i \in I}$ existe una familia $\{h_i: A_i \rightarrow B\}$ tal que $f \circ h_i = f_i$. Como F es un funtor topológico y $f: B \rightarrow A$ es pui, existe la familia $\{h_i: A_i \rightarrow B\}_{i \in I}$ con $F(h_i) = h_i$ y $f \circ h_i = f_i$ para cada $i \in I$.
2. Sean $g: A \rightarrow C$ y $h: D \rightarrow C$ morfismos de C con h subobjeto pui de C . Supongamos que existe una familia de morfismos $\{t_i: A_i \rightarrow D\}_{i \in I}$ tal que $h \circ t_i = g \circ f_i$. Entonces en D , h es monomorfismo y $h \circ t_i = g \circ f_i$. Puesto que $f: B \rightarrow A$ es la unión de la familia $\{f_i: A_i \rightarrow A\}$ en D , existe un morfismo $a: B \rightarrow D$ tal que $g \circ f = h \circ a$. Puesto que h es pui, existe $a: B \rightarrow D$ tal que $F(a) = a$. y $h \circ a = g \circ f$. La unicidad de a se sigue de la fidelidad de F y la unicidad de a .

3.5. Proposición

Sea $F : C \rightarrow D$ un funtor topológico. Si D es una categoría con intersecciones, entonces C es una categoría con intersecciones de subobjetos *pui*.

Dem os tración

Sea A un objeto de C y sea $\{f : A \rightarrow A\}_{E \in I}$ una familia de subobjetos *pui* de A . Entonces se determina en D la familia de subobjetos de A : $\{f_i : A_i \rightarrow A\}_{i \in I}$. Sea $f : B \rightarrow A$ junto con la familia $\{h : B \rightarrow A\}$ la intersección de dicha familia. Puesto que F es un funtor topológico, existen B en C tal que $F(B) = B$ y $f : B \rightarrow A$ tales que $F(f) = f$. Puesto que para cada $i \in I$, $f : A \rightarrow A$ es subobjeto *pui* de A , existe $h : B \rightarrow A_i$ tal que $F(h) = h$ y $f \circ h = f$. Para completar la prueba:

Sean B' un objeto de C , $\{g_i : B' \rightarrow A_i\}_{i \in I}$ una familia de morfismos y $g : B' \rightarrow A$ tales que $f \circ g = g$. Entonces, en D , $f \circ g = g$. Luego en D existe, por la propiedad universal de la intersección, un morfismo $(p : B' \rightarrow B)$ tal que $f \circ p = g$ y $h_i \circ p = g_i$. Puesto que $f : B \rightarrow A$ es *pui*, existe $\langle p : B' \rightarrow B \rangle$ tal que $F[\langle p \rangle] = \langle p \rangle$ y $f \circ \langle p \rangle = g$. Análogamente, para cada $i \in I$, $h : B \rightarrow A_i$ es *pui*, luego $h_i \circ \langle p \rangle = g_i$. La unicidad de $\langle p \rangle$ está garantizada por la fidelidad de F .

4. Topos de Grothendieck asociados a un funtor topológico

Intuitivamente un topos puede considerarse como un universo que de alguna manera generaliza la categoría de los conjuntos, en el cual se interpreta la lógica intuicionista y en el que potencialmente se pueden desarrollar distintas áreas de las matemáticas. Es de anotar que fueron Lawvere y Tierney los primeros en proponer una definición de

topos elemental; posteriormente Mikkelsen halló definiciones equivalentes.

En *Sketches of an Elephant a Thopos Theory Compendium* [7], Johnstone hace diferentes descripciones de la definición de topos, veamos algunas de ellas:

"Un topos es una categoría de haces sobre un sitio"; "Un topos es una categoría con límites finitos y objetos potencia"; "Un topos es un espacio generalizado"; "Un topos es una semántica para sistemas formales intuicionistas". Como se señala en *Introducción a la teoría de topos* [11] y en *Sheaves in Geometry and Logic* [8] una de las primeras fuentes de la teoría de topos es la geometría algebraica, en particular el estudio de los haces, a cuya presentación deseamos aproximarnos a través de ejemplos conocidos, de los que sólo mencionaremos su definición, los cuales se relacionan con las categorías de conjuntos y espacios topológicos. Las definiciones dadas en este párrafo siguen a *Topoi, the Categorical Analysis of Logic* [5].

4.1. La noción de topos

Formalmente un topos elemental es una categoría E tal que:


1. E es finitamente completa.
2. E tiene exponenciación.
3. E tiene subobjeto clasificador.

Los puntos 1. y 2. constituyen la definición de "cartesiana cerrada" y 1. puede ser reemplazada por "E tiene objeto terminal y productos finitos".

Se dice que una categoría E tiene exponenciación si el funtor Ax tiene adjunto a derecha, lo cual es equivalente a decir que dados dos objetos A y B en E , existe un objeto notado B^A y un morfismo $\varepsilon : B^A \times A \rightarrow B$ llamado

la evaluación tal que para todo objeto C de \mathcal{E} y todo morfismo $f: C \times A \rightarrow B$ existe un único morfismo $\langle p: C \rightarrow B^A \rangle$ tal que $\mathcal{L} \circ \langle p \times \text{id} \rangle = f$. De este modo, se generaliza la noción de conjunto potencia y la función evaluación de la categoría de los conjuntos [5].

El subobjeto clasificador en un topos generaliza algunos de los papeles del conjunto $\{0,1\}$ en la categoría de los conjuntos, esto es, determinar los subobjetos de un objeto dado y el de ser el ambiente para definir la lógica interna en el topos. Con más precisión, se dice que un objeto de \mathcal{E} es el objeto clasificador de \mathcal{E} si existe un morfismo $t: 1 \rightarrow \Omega$, llamado morfismo de verdad, de tal manera que para todo subobjeto A de un objeto X , existe un único morfismo $(p: X \rightarrow \Omega)$ que hace el siguiente diagrama conmutativo.



4.2. El topos $S_t(I)$

Sea I un espacio topológico y \mathcal{Q} la colección de sus abiertos. Un prehaz F sobre I es un funtor contra variante $F: \mathcal{Q} \rightarrow \text{Conj}$ en el que \mathcal{Q} es una categoría al considerar \mathcal{Q} como un conjunto ordenado por la inclusión. La categoría $S_t(I)$ tiene como objetos a los prehaces $F: \mathcal{Q} \rightarrow \text{Conj}$ y como morfismos $\circ: F \rightarrow G$ a las transformaciones naturales. $S(I)$ es un topos.

Un hecho importante es que la categoría $\text{Top}(I)$ es equivalente a la categoría $\text{Sh}(I)$, cuyos objetos se llaman haces de secciones sobre I , la cual es una sub-categoría plena de $S_t(I)$ formada por los prehaces que satisfacen el siguiente axioma:

Dado un cubrimiento abierto $\{V_j \mid j \in J\}$ de un abierto V y una selección

de elementos $s_j \in F(V_j)$, para todo $j \in J$, tal que $F_j(s_j) = F(V_j)$, para todos $j, t \in J$, entonces existe un único elemento $s \in F(V)$ tal que $F_j(s) = s_j$ para todo $j \in J$ [5].

Aclaremos la notación involucrada en este axioma. Si $F: \mathcal{Q} \rightarrow \text{Conj}$ es un prehaz, para cada $V \subset V'$ se determina por medio de F una función notada $F: F(V) \rightarrow F(V')$ y para todos $j, t \in J$, puesto que $V_j \cap V_t \subset V_j$ y $V_j \cap V_t \subset V_t$ se determinan por medio de F funciones que notamos $F_j: F(V_j \cap V_t) \rightarrow F(V_j)$ y $F_t: F(V_j \cap V_t) \rightarrow F(V_t)$.

Los topos $\text{Top}(I)$, $S_t(I)$, y $S_h(I)$ motivan el estudio de los topos de Grothendieck.

La generalización de haz, de carácter funtorial dada por Grothendieck, se basa en que tanto la noción de cubrimiento abierto, sus propiedades y el axioma anterior pueden ser definidas en términos de propiedades categóricas [5].

4.3. El topos de prehaces

Sea C una categoría pequeña. Un prehaz de conjuntos sobre C es un funtor contra variante $F: C \rightarrow \text{Conj}$. La categoría $\text{Set}^{C^{\text{op}}}$ tiene como objetos a los prehaces de C y por morfismos a las transformaciones naturales. $\text{Set}^{C^{\text{op}}}$ es un topos.

4.4. Topos de Grothendieck

Con el fin de ilustrar la noción general de haz y, por lo tanto, de Topos de Grothendieck mencionamos primero, en forma intuitiva algunas de las propiedades de los cubrimientos abiertos dados en topología.


Dados un espacio topológico X y un abierto A de X es claro que A recubre a A y que un recubrimiento de recubrimientos de abiertos de A es un recubrimiento de A . Además,

si B es un abierto de A , las intersecciones de un recubrimiento de A con B constituyen un recubrimiento de B .

Estas propiedades son expresables en términos de morfismos y conducen a la noción de "recubrimiento", con más precisión a la noción de pretopología en una categoría.

Así, una pretopología sobre una categoría pequeña C con productos fibrados, es una aplicación $Cub : \text{obj } C \rightarrow \text{Conj}$ que asigna a cada objeto A de C una colección de conjuntos de morfismos con codominio A , llamados cubrimientos de A , $Cub(A)$ que satisface los siguientes axiomas:

1. La identidad de A está en $Cub(A)$, esto es $1_A \in Cub(A)$.
2. Si $\{f_i : A \rightarrow A_i\}_{i \in I} \in Cub(A)$, y para cada $i \in I$, $\{f_j^i : A_j^i \rightarrow A_i\}_{j \in J_i} \in Cub(A_i)$, entonces:
3. Si $\{f_i : A_j^i \rightarrow A_i\}_{i \in I} \in Cub(A)$ y $g : B \rightarrow A$ es un morfismo en C , entonces para cada $i \in I$ el producto fibrado de f_i y g existe y $\{g_i : B \times_A A_i \rightarrow B\}_{i \in I} \in Cub(B)$



La pareja (C, Cub) es llamada un sitio.

Sea F un haz sobre C y Cub una pretopología sobre C . Sea $\{f : A \rightarrow A_i\}_{i \in I} \in Cub(A)$. Consideremos el producto fibrado de f_i , f_j para $i, j \in I$. Entonces, al aplicar el funtor F se determinan las funciones

$$\begin{aligned}
 &F_{ji} : F(A_i) \rightarrow F(A_i \times_A A_j), \\
 R_i : F(A_j) \times_{F(A_i \times_A A_j)} F(A_i) &\rightarrow F(A_i) \quad F(A)
 \end{aligned}$$

Un haz sobre el sitio (C, Cub) es un haz, si y solamente si, para todo cubrimiento

$$\{f_i : A_i \rightarrow A\}_{i \in I} \in Cub(A)$$

y para toda selección de elementos $s \in F(A)$ para todo $i \in I$ tales que $F^i(s) = F^j(s)$ para todos $i, j \in I$, existe un único elemento $s \in F(A)$ tal que $F(s) = s_i$ para todo $i \in I$. La subcategoría plena de Set^{C^p} cuyos objetos son los haces sobre el sitio (C, Cub) se nota $Sh(Cub)$.

Un topos de Grothendieck es una categoría equivalente a una categoría de la forma $Sh(Cub)$. Las nociones de carácter más general de haz y topos de Grothendieck sobre un sitio (C, J) en el que J es una topología de Grothendieck pueden encontrarse entre otros en Introducción a los topos de Grothendieck [4], Sheaves in Geometry and Logic [8] o Introducción a la teoría de topos [11].

Veamos ahora la manera de asociar una categoría de haces a una categoría topológica C , asociada a un funtor topológico $F : C \rightarrow U$ siendo D una categoría pequeña con productos fibrados

1. Sea $Cub : \text{obj } D \rightarrow \text{Conj}$ una pretopología. Entonces para cada objeto A de C , un cubrimiento de A en D determina por estructuras iniciales un cubrimiento de A en C . Por lo tanto, se determina una pretopología $Cub : \text{obj } C \rightarrow \text{Conj}$ determinada por Cub . Este hecho sigue haciendo uso de las propiedades que tiene el funtor F , resultando en este caso la existencia de los productos fibrados en C cuando D los tiene.
2. Si además (D, Cub) es un sitio, entonces (C, Cub) es un sitio.

Sea $H : D \rightarrow \text{Conj}$ un haz asociado a (D, Cub) , entonces $H \circ F : C \rightarrow \text{Conj}$ es un haz asociado a (C, Cub) . En efecto, sea $\{f_i: A_i \rightarrow A\}_{i \in I} \in \text{Cub}(A)$. Entonces, por la observación anterior, este ha sido construido con base en una familia $\{fA \rightarrow A\} \in \text{Cub}(A)$. Sea $\{S\}$ con $s_i \in G(H \circ F)_j(S_i)$ para $i \in I$, tal que $(H \circ F)_j(s_i) = (H \circ F)_j(S)$. Entonces se ha determinado la familia s con $s \in G(H(A))$ y $H^j(S) = H_j(s)$. Como H es haz existe $s \in G(H(A))$ tal que $H(s) = s$, luego se $(H \circ F)(A)$ y $(H \circ F)(s) = s$. Si $z \in (H \circ F)(A)$ verifica $(H \circ F)(z) = s$, entonces $z \in G(H(A))$ y $H_j(z) = s$, y como H es haz entonces $z = s$. Por lo tanto, $H \circ F$ es un haz. Entonces, se ha determinado una categoría de haces sobre C asociada a F ya (D, Cub) .

5. Notas finales

1. En el párrafo 4 queda la pregunta ¿la categoría de los haces determinados de esa manera es un topos?, ¿es un topos de Grothendieck?
2. Nótese la potencia de las propiedades del funtor F . ¿Qué otras construcciones de este estilo se pueden obtener?
3. Ante todo, se plantea la inquietud de dar ejemplos de las construcciones anteriores.

Referencias bibliográficas

- [1] Adamek, J.(1983). *Theory of Mathematical Structures*. Boston, Lancaster: D. Reidel Publishing Company.
- [2] _____, Herrlich, H., Strecker, G. (1990). *Abstract and Concrete Categories*. Nueva York: John Wiley and Sons Inc.
- [3] Ardila, V., Montañez, R. y Rosas, D. (1997). "Topologías asociadas a algunos constructos topológicos - La categoría de los espacios de proximidad". *Encuentro de geometría y sus aplicaciones*, Universidad Pedagógica Nacional.

- [4] Caicedo, X. (1998). *Introducción a los topos de Grothendieck*. Bogotá: Publicación Departamento de Matemáticas, Universidad de los Andes.
- [5] Golblatt, Robert. (s.d.). *Topoi, the categorical analysis of logic*. s.d.
- [6] Hernández, Jorge A. (1989). *Categoría de los Módulos*. Bogota: Tesis de grado de Especialista en Matemática Avanzada. Universidad Nacional de Colombia.
- [7] Johnstone, Peter T. (2002). *Sketches of an Elephant a Topos Theory Compendium*. Vol 1, 2. s.d.: Oxford Science, Publications.
- [8] Mac Lane, Saunders e Ieke Moerdijk. (1994). *Sheaves in Geometry and Logic*. s.d.: Springer Verlag.
- [9] Mitchell, B. (1965). *Theory of Categories*. Nueva York: Academic Press.
- [10] Montañez, R., Ruiz, C. (2005). *Elevadores y coelevadores de estructuras*. Bogotá: Preprint.
- [11] Oostra, A. (1996). *Introducción a la teoría de topos*. Bogotá: Publicación del Coloquio Distrital de Matemáticas y Estadística.
- [12] Pareigis, B. (1970). *Categories and Functors*. Nueva York: Academic Press.
- [13] Preuss, G. (s.d.). *Theory of Topological Structures*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.
- [14] Ruiz, C., Ardila, V. y Montañez, R. (2000). "Nociones equivalentes de categorías topológicas". *Boletín de Matemáticas*, Nueva serie, Volumen VII, Número 1; Junio. Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.
- [15] Willard S.(1970). *General Topology*. s.d.: Addison Wesley Publishing Company.

